

„Die bessere Therapie zum besseren Preis“

⇒ Themen der Heilmittelökonomie

Entwicklung der Heilmittelkosten 1. Halbjahr 2020

Im 1. Halbjahr 2020 betrug die Kostensteigerung +74,4 Mio. € bzw. 4,64 %, wobei die Hälfte dieser Kostensteigerung auf folgende Substanzen (Präparate) und angeführte Indikationen laut EKO Regeltext entfiel:

1. Apixaban (Eliquis): Vorhofflimmern, Venenthrombosen und Lungenembolien
2. Edoxaban (Lixiana): Vorhofflimmern, Venenthrombosen und Lungenembolien
3. Emtricitabin, Tenofovir Alafenamid und Bictegravir (Biktarvy): HIV
4. Dupilumab (Dupixent): atopische Dermatitis, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen
5. Ustekinumab (Stelara): Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Plaque-Psoriasis, Psoriatische Arthritis
6. Lenalidomid (Revlimid): multiples Myelom, Myelodysplastisches Syndrom, Mantelzell-Lymphom, Follikuläres Lymphom*
7. Emicizumab (Hemlibra): Hämophilie A
8. Erenumab (Aimovig): Migräneprophylaxe
9. Osimertinib (Tagrisso): Lungenkarzinom
10. Ropeginterferon alfa-2b (Besremi): Polycythemia Vera*

*nicht im EKO, daher Indikationen laut Zulassung

Exforge, Exforge HCT

Unverändert hoch ist das Einsparpotenzial bei den Substanzkombinationen

- Amlodipin/Valsartan,
- Amlodipin/Valsartan/HCT,

wo mehrere kostengünstige Generika verfügbar sind.

Preisvergleich (Preisbasis November 2020) der Präparate mit Amlodipin, Valsartan und HCT in der verordnungsstärksten Wirkstärke:

Bezeichnung	Pkg	OP	Box	Kassen- zeichen	Kassen- verkaufspreis
Amlodipin/Valsartan/HCT "Stada" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 St	3	●		8,40
Amlodipin/Valsartan/HCT "Krka" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	30 St	3	●		9,60
Amlodipin/Valsartan/HCT "1A Pharma" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 St	3	●		9,05
Amlodipin/Valsartan/HCT "Sandoz" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 St	3	●		9,05
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 St	2	●	IND	20,30

⇒ Warnhinweise, Nebenwirkungen

Diphenhydramin (Dibondrin, Noctor, Vertirosan)

<https://www.fda.gov/media/142427/download>

Die FDA warnt vor lebensbedrohenden Komplikationen bei (absichtlicher) massiver Überdosierung, vor allem bei Jugendlichen.

⇒ Aktuelle Themen der trägerspezifischen Vertragspartnerinformationen

Erhöhte Mortalität bei PPI-Langzeittherapie

In der peer reviewed publizierte Kohortenanalyse mit Abrechnungsdaten der SV-Träger wurde der Einfluss der PPI auf das Überleben von Patienten mit Demenzerkrankungen mit dem einer Kontrollgruppe ohne Demenz verglichen.

Migräne – eine große Herausforderung

Zusammenfassung aktueller Empfehlungen zu Diagnose und Therapie

Was braucht unser Gesundheitswesen, Spezialisten oder Generalisten?

Nur die Zusammenarbeit von Generalisten und Spezialisten ist effektiv.

Der Einfluss eines gesunden Lebensstils auf die Lebenserwartung frei von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes

Aktuelle Studienergebnisse zeigen, dass ein gesunder Lebensstil zu deutlich erhöhten zusätzlichen gesunden Lebensjahren führt.

Die Vertragspartnerinfo ist auch online verfügbar, z. B. unter

<https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.817220&portal=oegkbportal>

⇒ Literaturhinweise

Efficacy and safety of rapid tests to guide antibiotic prescriptions for sore throat

Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jun 4;6(6):CD012431

Der Einsatz von Streptokokken Schnelltests reduziert Antibiotika Verordnungen.

Beiträge zur Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung (Band 29)

AMNOG-Report 2019

<https://www.dak.de/dak/download/gesundheitsreport-2099294.pdf>, Zugang am 23.9.2020

Nutzenbewertung von Arzneimitteln in Deutschland

Schwerpunkt: Höchstpreise für ein Mehr an Lebensqualität?

Atypical Femur Fracture Risk versus Fragility Fracture Prevention with Bisphosphonates

N Engl J Med. 2020 Aug 20;383(8):743-753

Das Risiko für atypische Frakturen steigt mit der Dauer der Bisphosphonattherapie und reduziert sich schnell nach Therapieabstinenz.

Effect of an Early Palliative Care Telehealth Intervention vs Usual Care on Patients With Heart Failure

JAMA Intern Med. 2020 Jul 27;180(9):1203-1213

Die Studie zeigte keinen Vorteil in der Lebensqualität durch telemedizinische Nachbetreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz.

New Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs for Management of Rheumatoid Arthritis

Oregon State Drug Review No. 6, August 2020

https://www.orpdl.org/durm/newsletter/osdr_articles/volume10/osdr_v10_i6.pdf, Zugang am 23.9.2020
Eine Übersicht und Kurzbewertung der aktuell verfügbaren Substanzen.

Epidemiologische Daten zu osteoporotischen Frakturen in Österreich

J. Miner. Stoffwechs. Muskuloskelet. Erkrank. vol 27, 108–110 (2020)

Obwohl wirksame Therapien zur Vorbeugung osteoporotischer Frakturen zur Verfügung stehen, erhält die große Mehrheit der PatientInnen in Österreich, die eine osteoporotische Fraktur erlitten haben, keine adäquate Osteoporosebehandlung.

Undertreatment of osteoporosis following hip fracture: a retrospective, observational study in Singapore

Arch Osteoporos. 2020 Sep 11;15(1):141

Die Daten aus Ostasien zeigen das idente Ergebnis zur mehrfach publizierten österreichischen Situation. Stärkung des Problembewusstseins und Förderung der Therapietreue werden angeführt, um die Unterversorgung nach Schenkelhalsfrakturen zu reduzieren.

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

Eur Heart J. 2020 Aug 29

<https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa575/5898842>, Zugang am 23.9.2020

Neu ist, dass bei NSTEMI und PTCA Prasugrel gegenüber Ticagrelor bevorzugt empfohlen wird.

First Do No Harm: The report of the Independent Medicines and Medical Devices Safety Review

<https://www.immdsreview.org.uk/Report.html>, Zugang am 23.9.2020

An drei Beispielen wird aufgezeigt, dass die Qualitätssicherung im Gesundheitssystem versagt hat und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten. Die Beispiele sind ein hormonaler Schwangerschaftstest, Valproat bei Schwangeren und Vaginalimplantate.

Incidence of Hip Fracture Over 4 Decades in the Framingham Heart Study

JAMA Intern Med. 2020 Jul 27;180(9):1-7

Die Inzidenz von Hüftfrakturen ist gesunken, parallel zu einer Reduktion beim Nikotin- und Alkoholkonsum.

The effectiveness of honey for symptomatic relief in upper respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis

BMJ Evid Based Med. 2020 Aug 18

Die Überversorgung mit Antibiotika bei viralen Atemwegsinfektionen ist ein oft diskutiertes Problem. Die Übersichtsarbeit fasst als Alternative die Daten zu Honig zusammen.

Sex differences between women and men with COPD: A new analysis of the 3CIA study

Respir Med. 2020 Sep;171:106105

Ergebnis dieser Studie ist, dass sich der Symptomenkomplex der COPD geschlechtsspezifisch unterscheidet und dass Frauen eine höhere Überlebensrate haben.

Impact of physicians' participation in noninterventional post-marketing studies on their prescription habits: A retrospective 2-armed cohort study in Germany

PLoS Med. 2020 Jun 26;17(6)

<https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003151>, Zugang am 23.9.2020

Ärzte, die an einer nichtinterventionellen Studie teilnehmen, verordnen im Folgejahr um 6% bis 8% mehr Präparate von der Studienmedikation.

Improving Transparency to Build Trust in Real-World Secondary Data Studies for Hypothesis Testing—Why, What, and How: Recommendations and a Road Map from the Real-World Evidence Transparency Initiative

Value Health. 2020 Sep;23(9):1128-1136

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109830152030190X?via%3Dihub>, Zugang am 23.9.2020

Empfehlungen für die Durchführung von Versorgungsforschungsstudien.

Survival and factors predicting mortality after major and minor lower-extremity amputations among patients with diabetes: a population-based study using health information systems

BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 Jul;8(1)

<https://drc.bmj.com/content/bmjdr/8/1/e001355.full.pdf>, Zugang am 23.9.2020

Die Studie bestätigt die hohe Mortalitätsrate nach Amputationen bei Diabetikern.

Risikofaktoren sind die Größe der Amputation und Depression als Begleiterkrankung.

Are Unit Costs the Same? A Case Study Comparing Different Valuation Methods for Unit Cost Calculation of General Practitioner Consultations

Value Health. 2020 Sep;23(9):1142-1148

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520321252?via%3Dihub>, Zugang am 23.9.2020

Autoren der MUW stellen verschiedene Modelle zur Berechnung einer Arztkonsultation vor.

Epidemiology of major lower extremity amputations in individuals with diabetes in Austria, 2014-2017: A retrospective analysis of Health Insurance database.

Diabetes Res Clin Pract. 2020 Sep 28:108477

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822720307300?via%3Dihub>, Zugang am 8.10.2020

Mit Daten der österr. SV-Träger wurden Inzidenz und Sterblichkeit nach Beinamputationen bei Diabetikern evaluiert.

Unseren Newsletter finden Sie auch auf der Homepage der ÖGK (<http://www.oegk.at>);
Erklärung über die grundlegende Richtung: Fach- und Informationsblatt für Interessierte an der Arbeit der Argumentationsgruppe Heilmittel
Für den Inhalt verantwortlich: DI Berthold Reichardt, berthold.reichardt@oegk.at,
Tel.: 050766131405