

Zielvereinbarung

Newsletter März 2026

Änderungen der Individualhaftungsliste ab 01.03.2026

Sie finden die Liste der RE1, Red Box und No Box-Präparate, die anfragepflichtig sind, auf der Homepage der Ärztekammer: <https://www.aekooe.at/niedergelassen/kassenaerzte/arzneimittel>
Sowie auf der Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse:

<https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.886332&portal=oegkvportal>

Das Handbuch der Zielvereinbarung unter

<https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.787418&version=1713511835>

NEUERUNGEN:

- **Brinsupri Ftbl 25mg 28St.**

Brinsupri wird angewendet zur Behandlung von nicht durch Mukoviszidose (zystische Fibrose, CF) bedingten Bronchiektasen (Non-CF-Bronchiektasen, NCFB) bei Patient:innen ab 12 Jahren mit zwei oder mehr Exazerbationen in den vorangegangenen 12 Monaten.

Die Behandlung ist von einer Ärztin/einem Arzt einzuleiten, der in der Diagnose und Behandlung von Non-CF-Bronchiektasen, NCFB -Patient:innen erfahren ist.

- **Sprycel Ftbl alle Stärken und Größen**

SPRYCEL ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patient:innen mit

- neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-positiver (Ph+) chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase.
- CML in der chronischen oder akzelerierten Phase oder in der Blastenkrise mit Resistenz oder Intoleranz gegenüber einer vorherigen Behandlung einschließlich Imatinibmesilat.
- Ph+ akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphatischer Blastenkrise der CML mit Resistenz oder Intoleranz gegenüber einer vorherigen Therapie.

SPRYCEL ist angezeigt für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit:

- neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-positiver (Ph+) chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase (Ph+ CML-CP) oder Ph+ CML-CP mit Resistenz oder Intoleranz gegenüber einer vorherigen Therapie einschließlich Imatinib. IND-freie Alternativen im Handel.

- **Tasigna Hartkps alle Stärken und Größen**

Tasigna ist ein Arzneimittel zur Behandlung chronischer myeloischer Leukämie (CML), einer Krebserkrankung der weißen Blutkörperchen. Es wird bei Patient:innen angewendet, die „Philadelphia-Chromosom-positiv“ (Ph+) sind, das heißt, bei denen sich einige ihrer Gene so umgelagert haben, dass ein spezielles Chromosom entstanden ist, das als Philadelphia-Chromosom bezeichnet wird. Dieses Chromosom produziert ein Enzym namens Bcr-Abl-Kinase, das zur Entwicklung der Leukämie führt. Tasigna ist angezeigt in der „chronischen“ und „akzelerierten“ Phase von CML, wenn die Patient:innen andere Behandlungen, einschließlich der Behandlung mit Imatinib (ein anderes Krebsarzneimittel), nicht vertragen können oder nicht darauf ansprechen. Es liegen keine Informationen über seine Wirksamkeit bei Patient:innen vor, deren Erkrankung sich in der „Blastenkrise“ (einer anderen Phase von CML) befindet.

Tasigna wird ferner bei neu diagnostizierten Patient:innen mit CML in der chronischen Phase angewendet. IND-freie Alternativen im Handel.

- **Revolade Ftbl alle Stärken und Größen + Plv or. Susp. 25mg 30St.**
primärer Immnthrombozytopenie (ITP), einer Erkrankung, bei der das Immunsystem des Patient:innen die eigenen Blutplättchen (Blutbestandteile, die zur Blutgerinnung beitragen) zerstört. Patient:innen mit ITP haben einen Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) im Blut und weisen ein Blutungsrisiko auf. Revolade wird bei Patient:innen ab einem Alter von 1 Jahr angewendet, bei denen eine Behandlung mit Arzneimitteln wie Kortikosteroiden oder Immunglobulinen nicht gewirkt hat. Bei Kindern und Jugendlichen wird das Arzneimittel angewendet, wenn sie die Erkrankung seit mindestens 6 Monaten haben.
- Thrombozytopenie bei erwachsenen Patient:innen mit chronischer (Langzeit-)Hepatitis C, einer Erkrankung der Leber, die durch das Hepatitis-C-Virus verursacht wird. Revolade wird angewendet, wenn die Thrombozytopenie zu schwerwiegend ist, um eine Interferon-basierte Therapie (Behandlungsart für Hepatitis C) zuzulassen;
- erworbener schwerer aplastischer Anämie (eine Erkrankung, bei der das Knochenmark nicht ausreichend Blutzellen oder Blutplättchen bildet). Revolade wird bei Patient:innen angewendet, deren Erkrankung mit einer immunsuppressiven Therapie (Arzneimittel, die die Immunabwehr des Körpers herabsetzen) nicht beherrscht wird und die keine hämatopoetische Stammzelltransplantation (bei der das Knochenmark des Patient:innen durch Stammzellen eines Spenders ersetzt wird, um neues Knochenmark zu bilden) erhalten können. IND-freie Alternativen im Handel.

STREICHUNGEN:

- **Pomalidomid** → Preise angeglichen
- **Kerendia 100St.** → Keine relevanten Verordnungen
- **Velsipity.** → Regelkonforme Verordnungen
- **Remicade.** → Keine Verordnungen

Für Fragen zur **Verordnung von Arzneyspezialitäten** steht Ihnen die **Servicestelle** unter der **Telefonnummer 05 0766-14502900**, per E-Mail md-hmboe-hbs@oegk.at bzw. unser **Gesundheits-partnerportal (GPP) Quicklink „Arzneimittelbewilligungservice (ABS)“** zur Verfügung.

Ein Schreiben i. A. der Ärztekammer für Oberösterreich und
der O.Ö. § 2 Krankenversicherungsträger